



GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin N° 16 du 6 août 1996

Betterave

Maladies

Premières étoiles d'oïdium signalées dans la région de Lille (I.T.B.) et dans le Nord de la Somme.

L'arrivée de la maladie est donc plus tardive que les années précédentes.

Préconisation

Si vous êtes déjà intervenu, comptez environ 21 jours avant d'envisager une deuxième intervention.

Si vous n'êtes pas encore intervenu, vous avez probablement économisé un traitement, car une seule intervention avec un produit complet devrait être suffisante cette année (sauf éventuellement, pour les arrachages après le 15 octobre) :

ALTO BS (2 kg), ANTARES (1 l), ARMURE (0,6 l), CAPITAN (0,5 l), GEYSER (0,5 l), IMPACT R (1 l), PUNCH CS (0,5 l), SPYRALE (1 l).

Maïs

Pucerons orangés : *Sitobion avenae*

En progression, mais déjà bien contrôlé par les auxiliaires.

Les interventions insecticides sont rarement justifiées.

Le seuil est d'environ 3 000 pucerons par plante.

Si la pression est très forte, interventions possibles avec PIRIMOR (400 g/ha). Seul aphicide spécifique autorisé à ce stade sur maïs, cette spécialité préserve la faune auxiliaire, ce qui limite les ré-infestations ultérieures.

Pyrale

Pas d'évolution. Vol très faible en Sud Cambrésis. La zone à risque débute au Sud de St Quentin et ne concerne toujours pas notre région.

Pois

Tordeuses

Réseau de piégeage SPV - AVRIL - BONDUELLE

	Lieu	Capture du 1 ^{er} - 6 Août	Cumul
Artois	Mouriez-62	0	14
	La Thieuloye-62	0	162
	Fréwillers-62	14	294
Leas	Auchy les Mines-62	0	236
Flandre Maritime EST	Esquelbecq-59	0	12
	Herzele-59	14	404
	Hondschoote-59	0	44
	Warhem-59	15	/
	Bergues-59	2	28
	West-Cappel-59	0	76
OUEST	Quaëdypre-59	6	31
	Eperlecques-62	1	315

● Betterave

Arrivée de l'oïdium

● Maïs

Surveillez les pucerons

● Pois : tordeuses

Fin de vol en secteur tardif

Captures quasiment nulles sauf sur les postes semés très tardivement (Fréwillers, Warhem, Quaëdypre...). Partout ailleurs, le vol est presque insignifiant (0 à 2 captures).

Préconisations

Dans bien des cas, une intervention n'est plus nécessaire (faible vol et récolte dans moins de 7 jours).

Pour les secteurs très tardifs, renouveler les interventions à la même cadence (8-10 jours) mais attention aux délais avant récolte (pas moins de 7 jours pour DECIS, KARATE VERT...). Reportez-vous au bulletin N° 12.

